



# Un entomologiste à Bagnères : Henri Achard de BONVOULOIR

Henri de Bonvouloir naît en 1838. Il devient membre de la Société Entomologique de France en 1858 ; spécialisé dans l'étude des Coléoptères, il travaille sous la direction de Jacquelin-Duval. Il étudie spécialement la famille des Throscides (1859-1861) et effectue ensuite un gros travail sur la famille des Eucnémides, dont la publication en quatre fascicules totalisant 900 pages, avec de superbes planches de J. Migneaux, durera de 1871 à 1875.

Durant l'été, la maison de la rue de l'Université est le rendez-vous des entomologistes du monde entier. Les parents d'Henri de Bonvouloir accueillent, avec bonne grâce, les amis de leur fils unique (Brisout de Barneville, le Docteur Grenier...).



by Alexey K. Tshachkin  
*Rhagomicrus bonvouloiri*  
Horn, 1886 - Eucnemidae



La maison familiale à Bagnères

Avec eux, il explore chaque année les grottes des Hautes Pyrénées et de l'Ariège ; il est parmi les premiers à découvrir la faune hypogée qui habite sur les parois humides de ces cavités.

Il meurt à Paris en Juillet 1914.

Le genre *Aphaenops* à été créé par H. de Bonvouloir en 1861, pour accueillir des coléoptères carabiques découverts dans ces grottes. Ces insectes aveugles vivent sur les parois des cavités stalagmitées humides, ou ils chassent avec agilité de petites proies.

*Aphaenops leschenaulti* à été décrit la même année dans les pages des Annales de la Société Entomologique de France. Le type original provient de la grotte du Bédât et l'espèce est endémique du département des Hautes-Pyrénées. Henri de Bonvouloir est le descripteur d'une douzaine d'autres espèces de coléoptères (principalement du genre *Trixagus*, famille Throscidae ).

Découvreur de beaucoup d'espèces de coléoptères de la région, ses amis entomologistes lui ont dédié par amitié ces découvertes scientifiques en utilisant son nom latinisé comme nom d'espèce.

On peut citer *Donus bonvouloiri* Capiomont, 1867, *Speonomus bonvouloiri* Jacquelin du Val, 1859 et *Trechus bonvouloiri* Pandellé, 1867 pour les insectes pyrénéens, *Anthaxia bonvouloiri* Abeille de Perrin, 1869 Buprestide d'Afrique du nord, *Carabus bonvouloiri* Chaudoir, 1863 carabe d'Anatolie, *Hydrovatus bonvouloiri* Sharp, 1882 Dytiscidé du Japon...



3 mm  
*Donus bonvouloiri*  
Capiomont, 1867



Photo Société Entomologique de France

H. de Bonvouloir en 1859



3 mm  
*Aphaenops leschenaulti*  
Bonvouloir, 1861














2 mm  
*Trechus bonvouloiri*  
Pandellé, 1867



# Les Eucnémides par H. de BONVOULOIR, 1870-1875

Les Eucnémides sont des coléoptères de petite taille (rarement plus d'un centimètre), considérés comme peu courants. Les larves se développent dans les branches mortes ou le bois en décomposition colonisé par les champignons xylophages : les Eucnémides sont des saproxylophages.



Quelques-unes des planches de l'ouvrage sur les Eucnémides.